Ministry of the Environment of Slovak Republic Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Division of Geology and Natural Resources Sekcia geológie a prírodných zdrojov

Geological Survey of Slovak Republic štátny geologický ústav Dionýza Štúra
in cooperation with (v spolupráci s) the Geological Survey of Austria, Czech Geological Survey, Geological Institute of Hungary, Polish Geological Institute and Geological Survey of Ukraine

Legend to Geological Map of Western Carpathians and adjacent areas
Legenda ku geologickej mape Západných Karpát a priľahlých území

2000

Editors: J. Lexa, V. Bezák, M. Elecko, J. Mello, M. Polák, M. Potfaj, J. Vozár
Coeditors: G. W. Schnabel (Austria), P. Pálenský (Czech Republic), G. Császár (Hungary), W. Ryłko (Poland), B. Mackiv (Ukraine)

Compiled by (zostavili): J. Lexa, V. Bezák, M. Elecko, M. Eliáš, V. Koneený, Gy. Less, G. W. Mandl, J. Mello, P. Pálenský, P. Pelikán, M. Polák, M. Potfaj, Gy. Radócz, W. Ryłko, G. W. Schnabel, Z. Stráník, D. Vass, J. Vozár, T. Zelenka
in cooperation with (v spolupráci s) A. Biely, G. Császár, P. Etyroký, M. Kalieiak, M. Kohút, S. Kovács, B. Mackiv, J. Maglay, J. Nemeok š, A. Nowotny, L. Pentelényi, M. Rakús, A. Vozárová

NEOGENE – QUATERNARY BASINS NEOGÉN – KVARTÉRNE BAZÉNY

1 a – mostly fluvial gravel and sand, subordinate lacustrine deposits (basin accumulations, a - thickness over 200 m); *Pleistocene – Holocene?*
prevažne fluviálne štrky a piesky, menej lakustrické uloženiny (bazénové akumulácie, a - hrúbka nad 200 m); *pleistocén – holocén?*

2 freshwater limestones – travertines; *Pliocene – Pleistocene*
sladkovodné vápence – travertíny; *pliocén – pleistocén*

3 grey and variegated clays, silts, sands, gravels, thin lignite seams, freshwater limestones, and tuffite horizons; *Dacian – Romanian (up to Pleistocene in the foredeep, assigned to Late Pannonian in the Moravian and Austrian parts of the Vienna Basin)*
sivé a pestré íly, silty, piesky, štrky, tenké sloje lignitu, sladkovodné vápence a polohy tufov, tufitov; *dák – roman (v čelnej predhlbni až pleistocén,v moravskej a rakúskej časti viedenskej panvy považované za vrchný panón)*

4 clays with lignite, sands, gravels; Late Miocene – *Pliocene*
íly s lignitom, piesky, štrky; vrchný miocén – *pliocén*

5 variegated kaolinite clays, sands, gravels, rare lignite seams; *Pontian*
pestré kaolinické íly, piesky, štrky, ojedinelé slojе lignitu; *pont*

6 grey, mostly calcareous clays, silts, sands, gravels, lignite seams, freshwater limestone horizons; *Pannonian – Pontian (Pannonian only in the Moravian part of the Vienna Basin)*
sivé, prevažne vápnité íly, laminované silty, piesky, štrky, uholné íly, sloje lignitu a polohy sladkovodných vápencov, gejzírity; *panón – pont (v moravskej časti Viedenskej panvy len panón)*

7 grey and variegated clays, silts, sands, gravels/conglomerates, lignite seams, freshwater limestones, rhyolite, rhyodacite and andesite tuffs, diatomites, bentonites, turbidites; *Pannonian*
sivé a pestré vápnité íly, silty, piesky, štrky až zlepence, sloje lignitu, sladkovodné vápence, ryolitové, ryodacitové a andezitové tufy, diatomity, bentonity, turbidity; *panón*

8 grey calc. clays, variegated clays, sands/sandstones, siltstones, acid tuffs, bentonite, rare gypsum and lignite seams, freshwater silica deposits; *Sarmatian (Badenian – Pannonian in northern Hungary)*
sivé vápnité íly, pestré íly, piesky až pieskovce , siltovce, ryolity, kyslé tufy, bentonit, lokálne vložky lignitu a sádrovca, limnokvarcity; *sarmat (v sev. Maďarsku báden – panón)*

9 marls; *Sarmatian*
sliene; *sarmat*

10 clays, claystones, sandstones, conglomerates, gravels, Serpulid limestone intercalations; *Sarmatian*
íly, siltovce, pieskovce, zlepence, štrky, vložky serpulových vápencov; *sarmat*

11 grey calcareous clays/claystones, siltstones, sands/sandstones, conglomerates, acid tuffs, bentonite, limestones; diatomites and evaporites *Sarmatian (Late Badenian – Sarmatian west of the Vienna Basin and in Poland)*
sivé vápnité íly až ílovce, siltovce, piesky až pieskovce, zlepence, štrky, kyslé tufy, bentonit, organogénne vápence, diatomity a evapority; *sarmat (vrchný báden – sarmat z. od Viedenskej panvy a v Poľsku)*

12 Serpulid and Lithothamnia limestones (Leitha Lmst.), clastic limestones, subordinate conglomerates and sands; *Late Badenian – Sarmatian*
serpulové a litotamniové (litavské) vápence, klastické vápence, v menšej miere zlepence a piesky; *vrchný báden – sarmat*

13 grey claystones/siltstones, sandstones, conglomerates, coal seams, acid tuffs (Dobromil cgl., Niskowa, Iwkowa Fm.), andesite epiclastic rocks (in Carpathian nappes without volcanics); *Late Badenian – Sarmatian (Badenian only in Turčianska Kotlina Basin)*
sivé ílovce až siltovce, pieskovce, zlepence, uholné slojе, kyslé tufy (panvy na flyšových príkrovoch dobromilské zlepence, Niskowa, Iwkowá) a andezitové epiklastiká (vnútrokarpatské panvy); *vrchný báden – sarmat (v Turčianskej kotline len báden)*

14 grey and variegated calcareous claystones, siltstones, sandstones, conglomerates, thin coal seams, acid tuffs; *Late Badenian (including Middle Badenian in Hungary and Austria)*
sivé a pestré vápnité íly, ílovce, siltovce, piesky, pieskovce, zlepence, tenké slojе uhlia, kyslé tufy, riasové a moluskové vápence a kalkarenity; *vrchný báden (v Maďarsku a Rakúsku aj stredný báden)*

15 a, b grey calc. siltstones, claystones, sandstones/sands, conglomerates, intercalations of evaporites, local algal limestones and diatomic marls; a – with evaporites (Wieliczka Fm.); *Middle Badenian*
sivé vápnité siltovce, ílovce, pieskovce, piesky, zlepence, vložky evaporitov, v menšej miere riasové a sírou obohatené vápence, diatomitické sliene; a – s evaporitmi (Wieliczka); *stredný báden*

16 calcareous clays, sands, gravels, limestones (marginal parts of the Vienna); *Badenian*
vápnité íly, štrky, piesky, vápence (okraje rakúskej časti Viedenskej panvy); *báden*

17 a, b grey calcareous silts/siltstones, clays/claystones, sands/sandstones, subordinate gravels/conglomerates, Algal and Ostrea limestones, coal seams, tuffs/tuffites, locally anhydrites (Lanzendorf and Skawina Fms., Bohorodčany Fm. – Ukraine);a – mostly gravels and conglomerates (Moravian part of the foredeep); *Early Badenian (Badenian in the foredeep of Poland and Opava Basin)*
sivé vápnité silty, siltovce, íly, ílovce, piesky a pieskovce, zlepence, štrky, kyslé tufy, bentonit, organogénne vápence, uholné íly a slojе uhlia, tufy a tufity, lokálne anhydrity (lanzendorfské a skawinské súvr., bohorodčanské súvr. na Ukraine); a – prevažne štrky a zlepence (moravská časť čelnej predhlbne); *spodný báden (v čelnej hĺbine v Poľsku a Opavskej panve báden vcelku)*

18 grey and variegated, often calcareous claystones, siltstones, sandstones, conglomerates, gravels, breccias, evaporites, subordinate diatomites and thin coal seams; in the foredeep also lumachella limestones (Laa Fm., Balýč Fm., Biegonice Mb., Balice Mb.); *Karpatian*
sivé a pestré, niekedy vápnité ílovce, siltovce, pieskovce, zlepence, štrky, brekcie, evapority, menej diatomity a tenké slojе uhlia; v čelnej predhlbni miestami lumachelové vápence (laaské súvr., balyčské súvr., Biegonické vr., Balické vr.); *karpat*

19 grey claystones, siltstones, sands, organodetritic sandstones, conglomerates, coal seams, algal limestones (Salgótarján and Bánovce Fm.); Ottnangian
sivé ílovce, siltovce, piesky, organogénne pieskovce, zlepence, uholné slojе, riasové vápence; (salgótarjánske a bánovské súvr.); *otnang*

20 variegated clays, silts, sandstones, tuff and gravel intercalations (Stebnik Fm.); clays with evaporites, sands, conglomerate intercalations (Vorotiště Fm.); *Egerburgian – Ottnangian*
pestré íly, silty, pieskovce, vložky tufov a štrkov (stebnické súvr.), íly s evaporitmi, piesky, vložky zlepencov (vorotištské súvr.); *egenburg – otnang*

21 grey calcareous clays, claystones, silts, siltstones, sands, sandstones, gravels, conglomerates (Moravian part of the Vienna Basin and the Foredeep); *Eggenburgian – Ottnangian*
sivé vápnité íly, ílovce, silty, siltovce, piesky, pieskovce, štrky, zlepence (moravská časť viedenskej panvy a predhlbne); *egenburg – otnang*

22 variegated clays, sands, gravels, rhyodacite tuffs; *late Eggenburgian (also early Ottnangian in Hungary)*
pestré íly, piesky, štrky, ryodacitové tufy; *vrchný egenburg (v Maďarsku aj spodný otnang)*

23 calcareous silts/siltstones, claystones, sandstones, tuffites, variegated and grey clays, coal seams, conglomerates, breccias, organodetritic limestones; *Eggenburgian (including Ottnangian in the Vienna Basin)*
vápnité siltovce, ílovce, pieskovce, tufity, pestré a uhoľné íly, uhlie, zlepence, brekcie, organodetritické vápence; *egenburg (vo Viedenskej panve aj otnang)*

24 conglomerates (Drienovec, Vojková and Szuhogy Congl.), gravels, sands, sandstones, siltstones, clays, claystones, subordinate thin coal seams and limestones – continental facies (Žeretice, Klodno); *Early Miocene*
zlepence (drienovské, vojkovské a szuhodské), štrky, piesky, pieskovce, siltovce, íly a ílovce, menej tenké slojе lignitu a vápence – kontinentálny vývoj (Žeretice, Klodno); *spodný miocén*

25 clays, claystones, siltstones, sandstones; *Early Miocene*
íly, ílovce, siltovce, pieskovce; *spodný miocén*

26 grey calcareous siltstones, sands/sandstones, conglomerates, variegated clays, carbonaceous clays, thin coal seams; *Egerian (to Karpatian in Hungary)*
sivé vápnité siltovce, piesky/pieskovce, zlepence, pestré íly, uhoľné íly a tenké uhoľné slojе; *eger (až karpat v Maďarsku)*

27 organodetritic limestones, conglomerates, marlstones (Bretka, Budikovany and Cúkiás Mbs.); *Egerian*
organodetritické vápence, zlepence, slieňovce (bretské, budikovianske a cúkiáske vr.); *eger*

NEOGENE – QUATERNARY VOLCANIC FORMATIONS NEOGÉNNO – KVARTÉRNE VULKANITY

alkali basalts and basanites alkalické bazalty a bazanity

28 *Pliocene – Pleistocene*
pliocén – pleistocén
29 *Pontian*
pont
30 *Pannonian*
panón

rhyolites and rhyodacites ryolity a ryodacity

31 *Sarmatian – Pannonian*
sarmat – panón
32 *Karpatian – Badenian*
karpat – báden
33 *Early Miocene*
spodný miocén

amf–px, px–amf and bi–amf andesites to dacites amf–px, px–amf a bi–amf andezity až dacity

34 *Sarmatian – Early Pannonian*
sarmat – spodný panón
35 *Middle to Late Badenian*
stredný až vrchný báden
36 *Early Badenian*
spodný báden

basaltic, px and amf – px andesites bazaltické, px a amf – px andezity

37 *Sarmatian – Early Pannonian*
sarmat – spodný panón
38 *Badenian (Sarmatian? in the Borsod Basin)*
báden (sarmat? v Borsodskej panve)
39 *Early Badenian*
spodný báden
40 *Karpatian*
karpat

high–alumina basalts to basaltic andesites alkalicko–vápenaté bazalty až bazaltické andezity

41 *Late Sarmatian? – Pannonian*
vrchný sarmat? – panón

shoshonitic basalts to andesites šošonitické bazalty až andezity

42 *Sarmatian?*
sarmat?

subvolcanic intrusions subvulkanické intrúzie

43 granodiorites and granodiorite porphyry; *Middle Miocene*
granodiority a granodioritové porfýry; *stredný miocén*
44 quartz–diorite porphyry; *Middle Miocene*
kremitodioritové porfýry; *stredný miocén*
45 diorites and diorite porphyry; *Middle Miocene*
diority a dioritové porfýry; *stredný miocén*

volcanic forms and facies associations formy vulkanitov a faciálne asociácie

A necks, dykes
neky, dajky
B diatremes, maars and tuff cones
diatrémy, maary a tufové kužele
C scoria cones
troskové kužele
D small extrusive domes and tholoids
malé extrúzne dómy a protrúzie
E caldera (walled), caldera–like depression
kaldera (kalderový zlom), kalderovitá depresia
a small, often irregular intrusions
malé intrúzie a nepravidelné preniky
b propylitized complex of andesite porphyries and andesites
propylitizovaný komplex andezitových porfýrov a andezitov
c extrusive domes and dome flows
extrúzne dómy a domatické prúdy
d lava flows, effusive complex outside of the volcanic cone
lávové prúdy, efuzívny komplex mimo vulkanického kužeľa
e effusive cones
efuzívne kužele
g stratovolcanic cones
stratovulkanické kužele
h pyroclastic cones
pyroklastické kužele
i effusive complexes filling volcano-tectonic depressions
efuzívne komplexy vo výplni vulkanotektonických depresií
k stratovolcanic complexes filling volcano-tectonic depressions
stratovulkanické komplexy vo výplni vulkanotektonických depresií
l volcano-sedimentary complexes filling volcano-tectonic depressions
vulkanosedimentárne komplexy vo výplni vulkanotektonických depresií
m pyroclastic breccias, agglomerates and tuffs (proximal facies)
pyroklastické brekcie, aglomeráty a tufy (proximálne fácie)
n hyaloclastite breccias
hyaloklastitové brekcie
p ignimbrites, pumice tuffs, tuffs (proximal facies)
ignimbrity, pemzové tufy, tufy (proximálna fácia)

c fine, primary and reworked tuffs (distal facies)
jemné, primárne a redeponované tufy (distálna fácia)
b coarse to blocky breccias of dome/flow complexes
hrubé až blokové brekcie extrúznych komplexov
f coarse to fine epiclastic volcanic breccias
hrubé až drobné epiklastické vulkanické brekcie
e epiclastic volcanic conglomerates and sandstones
epiklastické vulkanické konglomeráty a pieskovce
v epiclastic volcanic sandstones and siltstones
epiklastické vulkanické pieskovce a siltovce
K freshwater silica deposits
limnokvarcity

PALEOGENE OF THE INNER CARPATHIANS AND BUDA PALEOGENE
PALEOGÉN VNÚTORNÝCH KARPÁT A BUDÍNSKY PALEOGÉN

46 sandstones, claystones, marls, coal seams, conglomerates, tuffites, variegated clays (Buda facies); *Oligocene*
pieskovce, ílovce, slieňovce, uholné slojе, zlepence, tufity, pestré íly (budínsky vývoj); *oligocén*

47 claystones, sandstones, conglomerates, coal, alginite, marly limestones, freshwater limestones (Buda facies); *Priabonian – Oligocene*
ílovce, pieskovce, zlepence, uhlie, alginit, slienité vápence, sladkovodné vápence (budínsky vývoj); *priabón – oligocén*

48 sandstones, subordinate shales: flysch (Biely potok, Chocholow and Ostryska Fms.); *Priabonian – Oligocene*
pieskovce, menej ílovce: flyš (bielopotocké, chocholowské a ostryské súvr.); *priabón – oligocén*

49 a sandstones, calcareous claystones, locally conglomerates: flysch, mostly claystones towards the base (Zuberec, Huty and Zakopane Fms.), a – mostly conglomerates (Šambron Mbr.); *Lutetian – Oligocene*
pieskovce, vápnité ílovce, lokálne zlepence: flyš, v spodnej časti prevaha ílovcov (zuberecké, hutianske a zakopanské súvr.), a – prevaha zlepencov (šambronské vr.); *lutét – oligocén*

50 conglomerates, sandstones, limestones, breccias, rare claystones (Borové Fm., Súľov Conglomerates, "Nummulitic Eocene" in Poland); *Lutetian – Priabonian*
zlepence, pieskovce, vápence, brekcie, ojedinelé ílovce (borovské súvr., súľovské zlep., v Poľsku "numulitový eocén"); *lutét – priabón*

51 organogeneous and allodapic limestones, claystones, marlstones, coal seams, variegated clays (Buda facies); *Eocene*
organogénne a alodapické vápence, ílovce, slieňovce, sloje uhlia, pestré íly (budínsky vývoj); *eocén*

52 pyroxene–amphibole andesites and hyaloclastite breccias; *Eocene*
pyroxenicko–amfibolické andezity a hyaloklastitové brekcie; *eocén*

MESOZOIC AND TERTIARY OF THE OUTER ALPS AND CARPATHIANS
MEZOZOIKUM A TERCIÉR VONKAJŠÍCH ALP A KARPAT

53 pale marls with sandstones, greenish–grey and brown claystones with pelitic siderite, subordinate dolomites and limestones, including diatomites at the top (KÞepice Fm., Šakvice Marls, Pavlovice Mbr.); *Egerian – Karpatian*
svetlé sliene s vložkami pieskov, zelenosivé a hnedé ílovce s pelokarbonátmi, ojedinele dolomity a organogénne vápence, v strope aj diatomity (KÞepické súvr., šakvické sliene, pavlovické vr.); *eger – karpat*

54 pale grey and ochre marls with intercalations of clayey dolomitic limestones (Boudky Marls, Michelstetten Mbr. In the Waschberg Zone); *Oligocene – Miocene (Egerian – Eggenburgian)*
svetlosivé a okrové sliene s vložkami a konkréciami ílových dolomitických vápencov (boudecké sliene, michelstettenské vr. vo waschberskej zóne); *oligocén – miocén (eger – egenburg)*

55 variable facies: calcareous greywacke sandstones and greenish/brownish–grey claystones, subordinate conglomerates (Ždánice–Hustopeče Fm.); *Oligocene – Miocene (Egerian)*
faciálne premenlivé: vápnité drobové pieskovce, zeleno– a hnedosivé vápnité ílovce, svetlé sliene, vložky kokolitových vápencov, lokálne zlepence (ždánicko–hustopečské súvr.); *oligocén – miocén (eger)*

56 calcareous sandstones, siltstones and claystones, locally conglomerates: flysch (Upper Krosno Mb.) *Late Oligocene – Early Miocene*
vápnité pieskovce, siltovce a ílovce, lokálne zlepence: flyš (vrchné krosnianské vr.) *vrchný oligocén – spodný miocén*

57 a, b calcareous sandstones, siltstones and claystones, locally conglomerates: flysch (Lgota Beloveska Mb. – Dryt and Lesko facies) *Oligocene* – a – distálnêjšies of Paleogene (g) and Cretaceous (k) rocks
vápnité pieskovce (miestami s litotamniami) a siltovce, vápnité ílovce, horizonty laminovaných vápencov (mypavský a hričovsko–žilinský vývoj), v Alpách flyš s brekciami litotamniových vápencov (kamburělské, gießhübelské, zweiersdorfské a wolfsgrabenské súvr.); a – rífový vápenec; *mastrichť? – paleocén – eocén*

MESOZOIC MEZOZOIKUM

97 marls, carbonate sandstones (also as flysch), limestones, conglomerates (Brezová and Gosau Groups) *Senonian*
sliene, karbonatické pieskovce (tiež ako flyš), vápence, zlepence (brezovská a gosauská skup.); *senón*

98 sandstones, marlstones, shales: flysch (Poruba, Tannheim, Rossfeld, Praznov and Losenstein Fms.); *Albian – early Turonian*
pieskovce, slieňovce, bridlice: flyš (porubské, tannheimské, rossfeldské, praznovské a losensteinské súvr.); *alb – starší turón;*

99 crinoidal limestones; *Early to Middle Cretaceous*
krinoidové vápence; *spodná až stredná kriedа*

100 conglomerates, breccias, sandstones, glauconitic (chloritic) sandstones and marls ; *Early to Middle Cretaceous*
zlepence, brekcie, pieskovce, glaukonitové (chloritové) pieskovce a sliene; *spodná až stredná kriedа*

101 organodetritic, locally cherty limestones (urgonian facies); *Barremian – Aptian*
organodetritické, miestami rohovcové vápence (urgónska fácia); *barém – apt*

102 bedded clayey limestones, marlstones (Mráznica and Schrambach Fms.); *Tithonian – Aptian*
vrstvovité ílovité vápence, slieňovce (mráznické a schrambašské súvr.); *titón – apt*

103 bedded cherty, marly limestones (Lučivná Fm.); Berriasian – *Early Aptian*
vrstvovité rohovcové, ílovité vápence (lučivnianske súvr.); *beriás – starší apt*

104 red nodular limestone, pink and pale radiolarian limestones; *Middle to Late Jurassic*
červené hľuznaté vápence, ružové a svetlé radioláriové vápence; *stredná až vrchná jura*

105 crinoidal and brachiopod-bearing red limestones and radiolarian cherts; *Early Jurassic*
červené krinoidové a brachiopodové vápence a rádiolarity; *spodná jura*

106 limestones, sandstones, sandy and spotted limestones, nodular and radiolarian limestones, radiolarites ("basinal facies" – Kössen, Gresten, Allgäu, Adnet, Ruhpolding, Žliator and Jasenina Fms.); *Rhaetian – Kimmeridgian*
vápence, pieskovce, piesčité a škvrnité vápence, hľuznaté a rádiolárové vápence, rádiolarity ("parvový vývoj" – kössenské, grestenské, allgäuské, adnetské, ruhpoldínske, žliatorské a jaseninské súvr.); *rét – kimeridž*

107 sandy and crinoidal limestones, cherty and nodular limestones at the upper part ("cordillera facies" – Tríeň, Tressenstein–Plassen Limestone and Oberalm Basal Conglomerate in the Alps); *(Rhaetian?) – Hettangian – Kimmeridgian*
piesčité a krinoidové vápence, v hornej časti rohovcové a hľuznaté vápence ("prahový vývoj" – tríenské súvr., v Alpách tressensteinsko–plassenský vápenec a oberalmský bazálny konglomerát); *(rét?) – hettanž – kimeridž?*

108 a, b shales, sandstones (Korenec Fm.), breccia limestones (Borinka L.) and breccias (Somár B.); *Early - Middle Jurassic*
bridlice, pieskovce (korenecké súvr.), brekciovité vápence (borinské) a brekcie (somárske); *spodná až stredná jura*

109 shales, radiolarites, sandstones and oolistostromes (Meliata Fm.), with rhyolites (Telekesoldal Fm.); *Lias – Callovian;* shales, radiolarites, ooidal limestones and oolistostromes of Bükk; *Middle - Late Jurassic*
bridlice, rádiolarity, pieskovce a oolistostrómy (meliatska formácia), s ryolitmi (telekesoldálské súvr.); *lias – kelovej;* bridlice, rádiolarity, oolitické vápence a oolistostromy Bükku; *stredná až vrchná jura*

110 basic magmatites of Bükk (Szarvaskő Basalt and Tardos Gabbro); *Middle Jurassic*
bázické magmatity Bükku (szarvaskőský bazalt a tardoššké gabro); *stredná jura*

111 variegated shales, sandstones, evaporites and dolomites (Carpathian Keuper Fm., also in the Klippen Belt); *Norian*
pestré bridlice, pieskovce, evapority a dolomity (karpatský keuper, aj v bradlovom pásme); *norik*

112 variegated limestones, locally shales (Hallstatt Facies – Hallstatt, Aflenz, Pötschen and Csővár Limestones, Reingraben and Zlambach shales, marls and limestones); *Norian – Rhaetian*
pestré vápence, lokálne bridlice (hallstattská fácia – hallstattské, aflenzské, pötschenské a csővárske vápence, reingrabenské a zlambašské bridlice, sliene a vápence); *norik – rét*

113 pale, mainly organodetritic limestones (Dachstein, Waxeneck, Tisovec, Furmanec and Alsóhegy Lmst.) and dolomites; *Carnian – Rhaetian*
svetlé, prevažne organodetritické vápence (dachsteinské, waxenecké, tisovské, furmanské a alsóhedské váp.) a dolomity; *karn – rét*

114 dolomites (Hauptdolomite Fm.), locally limestones (Opponitz, Dachstein, Kössen Lmst.) and shales; *Carnian – Norian;* in Bajuvarikum also Middle Triassic Sequence
dolomity (hlavné), lokálne vápence (opponické, dachsteinské, kössenské) a bridlice; *karn – norik;* v bajuvariku aj strednotriasová sekvencia

115 dark–grey shales and sandstones (Lunz Mb., Vesszős Fm. of Bükk); *Carnian*
tmavosivé ílovité bridlice a pieskovce (lunské vrstvy, vesszőšske súvr. v Bükku); *karn*

116 metamorphosed cherty limestones of the Turna sequence (Pötschen Lmst.) and Bükk (Felsőtárkány, Hollóstető and Rónabükk Lmst.); *Late Triassic*
metamorfované rohovcové vápence turniankej sukcesie (pötschenský váp.) a Bükku (felsőtárkánske, hollóstetské a rónabükkské vápence); *vrchný trias*

117 dark–grey limestones (Gutenstein L.) and dolomites (Wetterstein D., Hauptdolomite); *Middle to Late Triassic*
tmavosivé vápence (gutensteinské) a dolomity (wettersteinské, hlavné); *stredný až vrchný trias*

118 metamorphosed, light–grey, massive limestones of Bükk (Fehérkő, Bükkfensnik, Kisfennsik and Berva Lmst.); *Ladinian – Carnian*
svetlosivé masívne metamorfované vápence Bükku (fehérsky, bervianšky, bükkfenssícky a kisfenssícky vápenec); *ladin – karn*

119 dolomites, recrystallized and cherty limestones, shales (Föderata Succ.); *Middle to Late Triassic*
dolomity, rekryštalizované a rohovcové vápence, bridlice (föderátska sekv.); *stredný až vrchný trias*

120 dolomites, recrystallized limestones with glaukophanites, phyllites and metasiltstones (Dúbrava and Hačava Fms.); *Middle to Late Triassic, Jurassic*
dolomity, kryštalické vápence s glaukofanitmi, fylity a metasiltovce (dúbravské a hačavské súvr.); *stredný až vrchný trias, jura*

121 dolomites, metamorphosed light massive and dark cherty limestones, shales, tuffites (Turna sequence); *Middle - Upper Triassic - Jurassic?*
tmavé dolomity, metamorfované svetlé a tmavé rohovcové vápence, bridlice, tufity (turnianska sekvencia); *stredný - vrchný trias - jura?*

122 intermediate and basic volcanics of Bükk (Szentistvánhegy Metaandesite, Szinva Metabasalt); *Ladinian – Carnian*
intermediálne a bázické vulkanity Bükku (szentistvánhedský metaandezit, szinviansky metabazalt); *ladin – karn*

123 metamorphosed, light–grey, massive limestone of the Turna sequence (Steinalm Lmst.); *Anisian*
masívne svetlosivé metamorfované vápence turniankej sukcesie (steinalmské váp.) *anis*

124 dark to light limestones (Gutenstein and Wetterstein Lmst.) and dolomites (Ramsau, Wetterstein and Budaörs Dol.); *Anisian – Carnian*
tmavé až svetlé vápence (gutensteinské a wettersteinské) a dolomity (ramsauské, wettersteinské a budaörské) *anis – karn*

125 dark and light limestones (Gutenstein, Raming and Wetterstein Lmst.), dolomites (Reichenhall and Wetterstein Dol.) and cherty limestones (Reifling Lmst.); *Anisian – Carnian*
tmavé až svetlé vápence (gutensteinské, raminské a wettersteinské) a dolomity (reichenhalské a wettersteinské) a rohovcové vápence (reiflinské); *anis – karn*

126 limestones and dolomites ("carbonate platform" – Reichenhall, Gutenstein, Steinalm, Wetterstein, locally Schreyeralm, Nádaska, Reifling and Grafensteig Lmst.); *Anisian – Carnian*
vápence a dolomity ("karbonátová platforma" – reichenhalské, gutensteinské, steinalmské, wettersteinské, miestami schreyeralmské, nádaské, reiflinské a grafensteigské váp.); *anis – karn*

127 limestones, allodapic limestones. ("basin facies" – Gutenstein, Steinalm, Nádaska and Schreyeralm Lmst.); *Middle Triassic*
vápence, alodapické vápence ("bazénová fácia" – gutensteinské, steinalmské, nádaské a schreyeralmské váp.); *stredný trias*

128 quartzites, sandstones and shales (Semmering, Lúžna and Werfen Fms.); *Scythian*
kvarcity, pieskovce a bridlice (semmerinské a lúžňanské súvr., werfénske vr.); *skýt*

129 quartzites, sandstones, calcareous shales, and limestones (Benkov and Šuňava Mbs.); *Scythian*
kvarcity, pieskovce, vápnité bridlice a vápence (benkovské a šuňavské vr.); *skýt*

130 oolitic limestones, variegated sandstones and marls (Gerennavár and Ablakoskővölgy Fms. of Bükk, including Anisian Hámor Dolomite); *Scythian – Anisian*
oolitické vápence, pestré pieskovce a sliene (gerennavárske a ablakoskővölgyské súvr. Bükku, vrátane anisského hámorského dolomitu); *skýt – anis*

131 a sandstones, shales, calcareous shales, limestones, dolomites, locally rauwackes, gypsum, anhydrites (Szinpetri, Szin, Bódvaszilas, Werfen, Perkupa and Nová Ves Fms.); a – rhyolites; *Late Permian – Scythian*
pieskovce, bridlice, vápnité bridlice, vápence, dolomity, miestami rauvaky, sadrovce, anhydrity (szinpetriské, szinské, bódvaszilašské, werfénske, perkupské a novoveské súvr.) a – ryolity; *vrchný perm – skýt*

LATE PALEOZOIC MLADŠIE PALEOZOIKUM

132 shales, sandstones, rhyolite volcanics, subordinate dolomitic limestones and phosphatic sandstones (Štítnik Fm.); *Late Permian*
bridlice, pieskovce, ryolitové vulkanity, menej dolomitické vápence a fosfatické pieskovce (štítnické súvr.); *vrchný perm*

133 conglomerates, sandstones, shales (Prebichl Fm.); *Late Permian*
zlepence, pieskovce, bridlice (prebichelské súvr.); *vrchný perm*

134 dark algal limestones with dolomites and thin black shale intercalations (Szentlélek and Nagyvisnyó Fms.); *Middle to Late Permian*
čierne riasové vápence s dolomitmi a tenkými vložkami čiernych bridlíc (szentlélecké a nagyvišenské súvr.); *stredný až vrchný perm*

135 conglomerates, phyllites, green schists, riebeckite gneisses, metabasalts (Silbersberg Group); *Permian?*
zlepence, fylity, zelené bridlice, riebekitové ruly, metabazality (silbersberská skup.); *perm?*

136 conglomerates, sandstones, shales, rhyolite/dacite volcanics (Rimava, Brusno, Predajná, Korytné, Špania dolina, Skýcov, Medodoly and Devín Fms.); *Permian*
zlepence, pieskovce, bridlice, ryolitové/dacitové vulkanity (rimavské, brusnianske, predajnianske, korytnianske, španiodolinské, skýcovské, medodolské a devínske súvr.); *perm*

137 a, b conglomerates, sandstones, variegated shales, volcanics (Malužiná, Knola, Petrova Hora and Čejkov Fms.)
a – andesite–basalt volcanics; b – rhyolite volcanics; *Permian*
zlepence, pieskovce, pestré ílovité bridlice, vulkanity (malužinské, knolské, petrovohorské a čejkovské súvr.)
a – andezitovo–bazaltové vulkanity; b – ryolitové vulkanity; *perm*

138 conglomerates, sandstones, shales of the red beds type (Brusnik Fm.); *Early? – Late Permian*
zlepence, pieskovce, bridlice typu "red beds" (brusnické súvr.); *spodný? – vrchný perm*

139 a conglomerates, sandstones, rare rhyolite volcanics (Rožňava Fm.), a- strongly deformed (Bučina and Jasov Fm.); *Early Permian*
zlepence, pieskovce, *zriedkavo* ryolitové vulkanity (rožňavské súvr.), a - silno deformované (bučinské a jasovské súvr.); *spodný perm*

140 conglomerates, sandstones, shales, acid volcanics, rare coal (Slatvina, Čerhov, Tŕňa, Kašov, Luhyňa and Nižná Boca Fms.); *Late Carboniferous*
zlepence, pieskovce, bridlice, kyslé vulkanity, *zriedkavo* uhlie (slatvinské, čerhovské, tŕňanské, kašovské, luhyňské a nižnobocianske súvr.); *vrchný karbón*

141 shales, organodetritic limestones, conglomerates, sandstones (Mályinka and Szilvásvárad Fms.); *Late Carboniferous*
bridlice, organodetritické vápence, zlepence, pieskovce (mályinecké a szilvásváradské súvr.); *vrchný karbón*

142 conglomerates, sandstones, siltstones, shales, basic volcanics, rare organodetritic carbonate rocks (Rudňany, Zlatník and Hámor Fms.); *Late Carboniferous (Westphalian)*
zlepence, pieskovce, siltovce, bridlice, bázické vulkanity, *zriedkavo* organodetritické karbonáty (rudnianske, *zlatnícke* a hámorské súvr.); *vrchný karbón (vestfál)*

143 phyllites, metasiltstones, sandstones, rare conglomerates, acid volcanics and carbonate olistoliths (Turiec and Szendrő Fms.); *Late Carboniferous (Late Namurian – Early Westphalian)*
fylity, metasiltovce, pieskovce, *zriedkavo* zlepence, kyslé vulkanity a karbonátové olistolity (turiecke a szendrőške súvr.); *vrchný karbón (mladší namur – starší vestfál)*

144 grey shales, limestones (Lázbérc, Verebeshegy, Rakaca and Dedevár Fms.); *Early Carboniferous (Tournaisian – Visean)*
sivé bridlice, vápence (lázbércke, verebeshedské, rakacké a dedevárske súvr.); *spodný karbón (turnén – visén)*

145 a, b metamorfosed sandstones and conglomerates, phyllites, mafic volcanics, in the upper part dolomites and magnesites (Lubeník Fm., Bankov Beds); a – metabasalts, metagabbrodiorites (Hrádok and Črmeľ Fms.); *Early to Late Carboniferous (Visean – Early Namurian)*
metamorfované pieskovce a zlepence, fylity, bázické vulkanity, vo vrchnej časti dolomity a magnezity (ľubenícke súvr., bankovské vr.);
a – metabazality, metagabbrodiority (hrádocké a Črmeľské súvr.); *spodný až vrchný karbón (visén – starší namur)*

EARLY PALEOZOIC OF THE GEMERICUM, BÜKKICUM AND GRAUWACKENZONE IN THE ALPS
STARŠIE PALEOZOIKUM GEMERIKA, BÜKKIKA A DROBOVEJ ZÓNY ĽP

146 metasandstones, phyllites, rare metabasalts (Štós Fm.); *Late? Devonian – Early? Carboniferous*
metapieskovce, fylity, *zriedkavo* telesá metabazaltov (štóške súvr.); *vrchný? devón – spodný? karbón*

147 a, b metamorphosed spilito–keratophyre volcanics, phyllites, rare carbonates (Sykava Fm.), a – metabasalts; *Middle to Late Devonian?*
metamorfované spilitovo–keratofyrové vulkanity, fylity, *zriedkavo* karbonáty (sykavské súvr.), a – metabazality; *stredný až vrchný devón?*

148 a metasandstones, phyllites (Smrečina Fm.); a – spilite–keratophyre volcanics; *Middle – Late Devonian?*
metapieskovce, fylity (smrečinské súvr.); a – spilitovo–keratofyrové vulkanity; *stredný – vrchný devón?*

149 limestones (Szendrőlád Lmst.); *Middle Devonian*
vápence (szendrőladské váp.); *stredný devón*

150 limestones, bioherm limestones, sandy limestones, marbles, phyllites, mafic tuff intercalations (Abod, Rakacaszend, Bükkhegy and Uppony Fms.); *Devonian*
vápence, biohermné vápence, piesčité vápence, mramory, fylity, vložky bázických tufov (abodské, rakacaszendské, bükkhedské a uponské súvr.); *devón*

151 amphibolites, gneisses, metaultramaphic rocks, gabbro–diorites, marbles (Klátov and Vöstenhof Groups); *Early Paleozoic?, metamorphosed in Devonian?*
amfibility, ruly, metaultrabázity, gabrodiority, kryštalické karbonáty (klátovská a vöstenhofská skup.); *staršie paleozoikum?, metamorfóza v devóne?*

152 a metasandstones, phyllites, carbonates, cherts, rare conglomerates, basic volcanics (Dmava Fm.), a – acid volcanics; *Silurian – Early Devonian?*
metapieskovce, fylity, karbonáty, lydity, menej zlepence, báz. metavulkanity (drnavské súvr.), a – kyslé vulkanity; *silúr – spodný devón?*

153 shales, graphitic and silicic shales, cherts, sandstones, maphic volcanics, limestone and volcanic olistolithes (Tlapolcsány and Strázsahegy Fms.); *Silurian – Early Devonian*
bridlice, grafitické bridlice, kremité bridlice, lydity, pieskovce, bázické vulkanity, olistolity vápencov a vulkanitov (strázsahedské a tapolčianske súvr.); *silúr – spodný devón